

Gastroskopia

Informacje dla Pacjenta

Gastroskopia – jest to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka i dwunastnicy). Jest najlepszym sposobem na zlokalizowanie zmian chorobowych w wyżej opisanym fragmencie przewodu pokarmowego takich jak: zmiany zapalne, polipy, wrzody czy zmiany nowotworowe.

W trakcie badania jest także możliwość pobrania wycinków do dalszej analizy w celu pogłębienia diagnostyki.

Badanie to może mieć również zastosowanie terapeutyczne: tamowanie krwawienia, leczenie żylaków przełyku, usuwanie polipów.

Jakie są wskazania do gastroskopii?

- Bóle brzucha, dyspepsja, wymioty o niejasnej przyczynie.
- Objawy choroby refluksowej, zaburzenia połykania.
- Bóle w klatce piersiowej o niejasnej przyczynie.
- Przewlekła biegunka.
- Marskość wątroby.
- Utrata masy ciała.
- Niedokrwistość, niedobór żelaza.

Jak się przygotować?

- Przez 6 godzin przed badaniem nic nie jedz.
- Przez 2 godziny przed badaniem nic nie pij, nie pal papierosów, nie żuj gumy.

Co ze sobą przynieść?

- Wyniki poprzednich badań diagnostycznych i wypisy ze szpitala (jeśli mają związek z badaniem).
- Jeżeli używasz okularów do czytania – zabierz je ze sobą.

Leki

- W dniu badania zażyj leki przyjmowane na stałe popijając niewielką ilością wody.
- Jeżeli chorujesz na cukrzycę skonsultuj z lekarzem kierującym na badanie sposób przygotowania do gastroskopii - poinformuj o chorobie w trakcie rejestracji na badanie.
- Jeśli bierzesz leki zmniejszające krzepliwość krwi, to omów z lekarzem kierującym czy należy je odstawić i w jakim odstępie czasu przed wyznaczoną datą badania.
- Jeżeli przyjmujesz leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego (np.: Controloc, Emanera, Polprazol, Dexilant) to odstaw je na 14 dni przed gastroskopią.
- Jeżeli byłeś leczony antybiotykiem w ciągu 30 dni poprzedzających gastroskopię to – przesun termin badania (o ile nie jest to badanie w trybie pilnym).
- Przynieś ze sobą listę przyjmowanych na stałe leków.

Gastroskopia

Informacje dla Pacjenta

Jak przebiega badanie?

- Przed zabiegiem gardło jest znieczulane lidokainą, która łagodzi odczucia bólowe i odruch wymiotny pojawiający się w trakcie badania.
- Pacjent kładzie się na lewym boku.
- Lekarz lub pielęgniarka zakłada ustnik, przez który wprowadza endoskop – giętki przewód z kamerką i światłem.
- Badanie trwa zwykle od 5 do 7 minut.
- Po każdym badaniu endoskop jest myty i dezynfekowany.
- Wycinki do badania pobierane są jednorazowymi narzędziami.

Co zrobić po badaniu?

- Nie jedz nic i nie pij przez ok. 2 godziny po zakończonym badaniu.
- Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu.
- Przed każdą gastroskopią prosimy o podpisanie zgody na badanie.

Uwaga:

Badanie może wymagać dodatkowych opłat w przypadku wystąpienia konieczności podania znieczulenia, usuwania zmian, pobrania dodatkowych wycinków

Do badania niezbędne będzie podpisanie zgody na zabieg oraz zapoznanie się z innymi dokumentami, dlatego prosimy o przybycie odpowiednio wcześniej – 30 minut przed wyznaczonym terminem badania.