



Skórne testy alergiczne Informacje dla Pacjentów

Skórne testy punktowe (STP) wykonuje się, żeby wykryć lub potwierdzić uczulenie u Pacjentów np. z podejrzeniem atopowego zapalenia skóry, alergią na lek itp.

Jak się przygotować?

- Testów **nie wykonujemy w czasie infekcji**. Na badanie zgłoś się minimum 4-7 dni po jej zakończeniu.
- Testów **nie wykonujemy w czasie zaostrzenia reakcji alergicznej**.
- W **dniu badania** nie smaruj kremem (ani nawilżaczem) skóry przedramienia.

Leki

Jeżeli lekarz kierujący nie zaleci inaczej, przed testami odstaw:

- leki przeciwhistaminowe (Zyrtec, Claritine, Telfast, Eurespal, Hydroxyzyna) – **7-10 dni** przed badaniem,
- **trój- lub czterocykliczne leki przeciwdepresyjne** (Amitryptylina, Dezypramina, Doksepina) – min. **14 dni** przed badaniem,
- **glikokortykosteroidy** (przyjmowane doustnie lub w formie zastrzyku) – 1-3 tygodnie przed badaniem (zawsze o tym decyduje lekarz kierujący na badanie),
- **glikokortykosteroidy** (na skórę przedramienia) 1-2 tygodnie przed badaniem (zawsze decyduje o tym lekarz kierujący na badanie).

Na czym polega badanie?

- Specjalista medyczny naniesie na skórę Twojego przedramienia kroplę alergenu i nakłuje warstwę powierzchniową skóry. Po 15-20 minutach odczyta wyniki testu.





.....

Czy są jakieś przeciwwskazania?

- Wymienione w przygotowaniu.

