

# USG Doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych

## Informacje dla Pacjenta

**Badanie USG Doppler aorty** pozwala na szczegółową ocenę struktury aorty oraz jej rozgałęzień, umożliwiając wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, takich jak zwężenia czy tętniaki. Metoda Dopplera pozwala na ocenę prędkości przepływu krwi w naczyniach. W trakcie badania wykorzystywane są fale ultradźwiękowe. USG jest bezpieczne i nie naraża pacjenta na promieniowanie jonizujące.

### Jak się przygotować?

#### Dzień przed badaniem:

- Należy unikać spożywania pokarmów i napojów sprzyjających wzdęciom, takich jak rośliny strączkowe, napoje gazowane czy jogurty.
- Pacjenci z tendencją do wzdęć powinni zastosować lekkostrawną dietę już na dwa dni przed badaniem i zgodnie z zaleceniami lekarza, powinni w dniu poprzedzającym badanie stosować leki redukujące ilość gazów w jelitach. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosuje się Espumisan (80 mg 3 razy dziennie w dniu poprzedzającym badanie oraz 80 mg rano, na czczo, w dniu badania) lub inny lek zawierający symetykon. Są to środki dostępne bez recepty.

#### W dniu badania:

- Przed badaniem należy zrezygnować z picia kawy, żucia gumy i palenia papierosów.
- Jeśli badanie odbywa się przed godziną 12:00, pacjent powinien zgłosić się na czczo (ostatni posiłek w dniu poprzedzającym badanie powinien zostać spożyty około godziny 18:00).
- Jeśli badanie jest zaplanowane na godzinę 12:00 lub później, nie należy jeść żadnych posiłków przez co najmniej 6 godzin przed badaniem.
- Należy ubrać się w luźne ubranie, które łatwo zdjąć lub podwinąć, aby odsłonić brzuch podczas badania. Jeśli pacjent przyjmuje leki na stałe, powinien zażyć je zgodnie z zaleceniami lekarza, popijając niewielką ilością niegazowanej wody.

### Co ze sobą przynieść?

- Dowód osobisty, oryginały poprzednich wyników badań diagnostycznych oraz wypisy ze szpitala, jeśli pobyt był związany z badaniem.
- Jeżeli pacjent otrzymał papierowe skierowanie na badanie, bądź kod e- skierowania- należy zabrać je ze sobą.

### Jak przebiega?

Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej. Specjalista nakłada na badaną okolicę specjalny żel, a następnie przykładą głowicę aparatu. Cała procedura trwa kilkanaście minut, a pacjent otrzymuje wynik bezpośrednio po wizycie.